See T	O 1
Sichttiefe (m):	12
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	25
Primärproduzenten:	sehr wenig
Biomasseproduktion:	sehr wenig
Artenreichtum:	sehr groß
Phosphatgehalt (mg/m³)	8
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≤ 1
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	2,5
O_2- Gehalt (mg/l):	11
Verlandung/Tiefe:	sehr tief

See R	O 2
Sichttiefe (m):	7
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	18
Primärproduzenten:	sehr wenig
Biomasseproduktion:	sehr wenig
Artenreichtum:	sehr groß
Phosphatgehalt (mg/m³)	9
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≤ 1
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	3,0
O_2- Gehalt (mg/l):	10
Verlandung/Tiefe:	sehr tief

See O	O 3
Sichttiefe (m):	5
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	12
Primärproduzenten:	sehr wenig
Biomasseproduktion:	sehr wenig
Artenreichtum:	sehr groß
Phosphatgehalt (mg/m³)	10
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≤ 1
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	3,5
O_2- Gehalt (mg/l):	9
Verlandung/Tiefe:	sehr tief

See P	M 1
Sichttiefe (m):	4
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	10
Primärproduzenten:	wenig
Biomasseproduktion:	wenig
Artenreichtum:	groß
Phosphatgehalt (mg/m³)	12
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≤ 1
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	4,0
O_2- Gehalt (mg/l):	8
Verlandung/Tiefe:	tief

See H	M 2
Sichttiefe (m):	2
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	7
Primärproduzenten:	wenig
Biomasseproduktion:	wenig
Artenreichtum:	groß
Phosphatgehalt (mg/m³)	24
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≤ 1
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	5,5
O_2- Gehalt (mg/l):	7
Verlandung/Tiefe:	tief

See I	M 3
Sichttiefe (m):	1,5
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	5
Primärproduzenten:	wenig
Biomasseproduktion:	wenig
Artenreichtum:	groß
Phosphatgehalt (mg/m³)	35
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≤ 1
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	6,5
O_2- Gehalt (mg/l):	6
Verlandung/Tiefe:	tief

See E	E 1
Sichttiefe (m):	1,4
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	1,9
Primärproduzenten:	viel
Biomasseproduktion:	viel
Artenreichtum:	klein
Phosphatgehalt (mg/m³)	38
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≥2
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	8,0
O_2- Gehalt (mg/l):	4
Verlandung/Tiefe:	flach

See S	E 2
Sichttiefe (m):	1,2
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	1,6
Primärproduzenten:	viel
Biomasseproduktion:	viel
Artenreichtum:	klein
Phosphatgehalt (mg/m³)	67
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≥2
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	9,5
O_2- Gehalt (mg/l):	3
Verlandung/Tiefe:	flach

See T	E 3
Sichttiefe (m):	0,8
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	1,3
Primärproduzenten:	viel
Biomasseproduktion:	viel
Artenreichtum:	klein
Phosphatgehalt (mg/m³)	92
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≥2
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	10,5
O_2- Gehalt (mg/l):	2
Verlandung/Tiefe:	flach

See U	H 1
Sichttiefe (m):	0,9
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	0,9
Primärproduzenten:	sehr viel
Biomasseproduktion:	sehr viel
Artenreichtum:	sehr klein
Phosphatgehalt (mg/m³)	100
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≥2
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	11
O_2- Gehalt (mg/l):	0
Verlandung/Tiefe:	sehr flach

See F	H 2
Sichttiefe (m):	0,5
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	0,8
Primärproduzenten:	sehr viel
Biomasseproduktion:	sehr viel
Artenreichtum:	sehr klein
Phosphatgehalt (mg/m³)	118
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≥2
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	11,5
O_2- Gehalt (mg/l):	0
Verlandung/Tiefe:	sehr flach

See E	H 3
Sichttiefe (m):	0,4
Tiefengrenze der submersen(abgetauchten) Vegetation (m):	0,6
Primärproduzenten:	sehr viel
Biomasseproduktion:	sehr viel
Artenreichtum:	sehr klein
Phosphatgehalt (mg/m³)	137
Nitrat- und Ammoniumgehalt im Herbst (mg N pro l):	≥2
Chlorophyllgehalt im Sommer (mg/ m³):	12
O_2- Gehalt (mg/l):	0
Verlandung/Tiefe:	sehr flach