

Schwarzer Holunder (Fliederbeere)

Sambucus nigra

Moschuskrautgewächse (*Adoxaceae*)

Ursprung: Einheimisch

Von einem direkten Verzehr der Beeren wird abgeraten. Gekocht eignen sie sich jedoch für Säfte und Gelees.



Der Beginn der **Blüte** zeigt den Beginn des **Frühsommers** an. Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn an einer Trugdolde "etwa die Hälfte der Einzelblüten vollständig geöffnet sind" (DWD 2021: 72).
Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1961-1990: 12. Juni
Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1991-2020: 1. Juni



Die ersten reifen **Früchte** zeigen den Beginn des **Spätherbstes** an. Der Zeitpunkt ist erreicht, "wenn alle Früchte der am weitesten ausgereiften Trugdolde endgültig blau-schwarz geworden sind" (DWD 2021: 72).
Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1961-1990: 13. September
Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1991-2020: 1. September



Daten: DWD (2021)



Bildquellen:

File: 00_3775 Schwarzer Hollunder (Sambucus nigra).jpg
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:00_3775_Schwarzer_Hollunder_\(Sambucus_nigra\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:00_3775_Schwarzer_Hollunder_(Sambucus_nigra).jpg)
User: W. Bulach
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

File: Sambucus nigra-fruit001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sambucus_nigra-fruit001.jpg
User: Agnieszka Kwiecień (Nova)
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>