

Stieleiche

Quercus robur

Buchengewächse (*Fagaceae*)

Ursprung: Einheimisch

In Mitteleuropa ist die Stieleiche die am weitesten verbreitete Eichenart.



Die **Blattentfaltung** zeigt den **Vollfrühling** an.

Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn sich die ersten Blätter vollständig entfaltet haben.

Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1961-1990: 14. Mai

Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1991-2020: 2. Mai



Die ersten reifen **Früchte** (Eicheln) zeigen den **Vollherbst** an.

Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn die ersten Eicheln vom Baum fallen.

Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1961-1990: 28. September

Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1991-2020: 21. September



Der **Blattfall** zeigt den Winter an.

Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn die Blätter älterer Stiel-Eichen verstärkt vom Baum fallen.

Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1961-1990: 2. November

Eintrittsdatum für Schleswig-Holstein 1991-2020: 4. November



Daten: DWD (2021)



Bildquellen:

File: Fagales - Quercus robur - 61.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagales_-_Quercus_robur_-_61.jpg
User: Emőke Dénes
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

File: Stieleiche Quercus robur 4159.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stieleiche_Quercus_robur_4159.jpg
User: Nobbip
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

File: English Oak (Quercus robur) autumn leaf (8260043455).jpg
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:English_Oak_\(Quercus_robur\)_autumn_leaf_\(8260043455\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:English_Oak_(Quercus_robur)_autumn_leaf_(8260043455).jpg)
User: Peter O'Connor aka anemoneprojectors
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>